

# Lineární algebra — 11. přednáška: Vlastní čísla a vektory



Dalibor Lukáš

Katedra aplikované matematiky  
FEI VŠB–Technická univerzita Ostrava

email: dalibor.lukas@vsb.cz

<http://www.am.vsb.cz/lukas/LA1>



Text byl vytvořen v rámci realizace projektu *Matematika pro inženýry 21. století* (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0332), na kterém se společně podílela Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Západočeská univerzita v Plzni




evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY




OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Motivace: Vlnovody

Optické kabely propagují pouze některé světelné módy



## Motivace: Vlnovody

### Vlnovod: Laplaceova úloha vlastních čísel

Uvažujme kruhový profil vlnovodu  $\Omega$ , jeho hranici (kružnici)  $\Gamma$ . Předpokládejme  $\mathbf{E}(\mathbf{x}; t) = (0, 0, E(x_1, x_2) \cos(\omega(t + x_3/c)))$ , pak

hledáme  $\omega > 0$  a  $E(x_1, x_2) \neq 0$ :

$$\begin{cases} -c^2 \Delta E(x_1, x_2) = \omega^2 E(x_1, x_2) & \text{pro } (x_1, x_2) \in \Omega, \\ E(x_1, x_2) = 0 & \text{pro } (x_1, x_2) \in \Gamma, \end{cases}$$

kde  $c$  je rychlost světla. Triangulujeme  $\Omega$  a předpokládáme spojitě po trojúhelnících lineární (přesněji afinní) bázové funkce  $B := (b_1(x_1, x_2), \dots, b_n(x_1, x_2))$  takové, že  $b_i(x_1, x_2) = 0$  na  $\partial\Omega$ , dostáváme algebraickou **úlohu hledání vlastních čísel a vektorů**:









hledáme  $\omega > 0$  a  $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$ :

$$(c^2 \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e} = \omega^2 \mathbf{e},$$

kde  $\mathbf{e} := [E(x_1, x_2)]_B$  a  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{e} = [-\Delta E(x_1, x_2)]_B$  jsou souřadnicové vektory.


# Motivace: Vlnovody

Vlastní módy  $E(x_1, x_2)$  válcového vlnovodu



# Motivace: Časové průběhy veličin v lineárních obvodech

## Přechodové jevy v RLC obvodu



Průběh proudu  $i(t)$  a náboje  $q(t)$  po připojení stejnosměrného zdroje k sériovému RLC obvodu lze popsat následující soustavou obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu:

$$\left\{ \begin{array}{l} Ri(t) + L i'(t) + \frac{1}{C} q(t) = U \text{ pro } t > 0, \\ i(t) = q'(t) \text{ pro } t > 0, \\ i(0) = 0, \\ q(0) = 0. \end{array} \right.$$

# Motivace: Časové průběhy veličin v lineárních obvodech

## Přechodové jevy v RLC obvodu


Předpokládáme řešení ve tvaru  $\mathbf{x}(t) := \begin{pmatrix} i(t) \\ q(t) \end{pmatrix} = \operatorname{Re} \{ e^{\lambda_1 t} \mathbf{e}_1 + e^{\lambda_2 t} \mathbf{e}_2 \} + \begin{pmatrix} 0 \\ CU \end{pmatrix}$  :

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{LC} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x}(t) + \begin{pmatrix} \frac{U}{L} \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{x}'(t), \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{0}. \end{cases}$$

Tato úloha se redukuje na hledání vlastních čísel  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$  a vl. vektorů  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \in \mathbb{C}^2$ :

$$\begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{LC} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{e}_i \quad \text{s podmínkou } \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -CU \end{pmatrix}.$$

Pro  $R = L = C = U = 1$ :




# Vlastní čísla a vektory

## Definice

Mějme čtvercovou matici  $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ . **Vlastní číslo**  $\lambda \in \mathbb{C}$  a jemu odpovídající **vlastní vektor**  $\mathbf{e} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$  splňují následující (nelineární) rovnici:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{e} = \lambda \mathbf{e}.$$

Množina všech vlastních čísel  $\sigma(\mathbf{A}) \subset \mathbb{C}$  se nazývá **spektrum matice**.



## Vlastní čísla a vektory

### Příklad: Vlastní čísla a vektory jednotkové matice.

Hledejme  $\lambda \in \mathbb{C}$  a  $\mathbf{e} \in \mathbb{C}^n$  tak, že

$$\underbrace{\mathbf{I} \cdot \mathbf{e}}_{=\mathbf{e}} = \lambda \mathbf{e}.$$

Řešením je jediné vlastní číslo  $\lambda := 1$ , jemuž odpovídá lib. vektor  $\mathbf{e} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ .

### Příklad: Vlastní čísla a vektory diagonální matice.

Pro diag. matici platí:  $\mathbf{D} \cdot \mathbf{e}_i = \underbrace{d_{ii}}_{=:\lambda_i} \mathbf{e}_i$ , kde  $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$  je  $i$ -tý sloupec jednotk. matice.

### Nulovému prostoru odpovídá nulové vlastní číslo.

Mějme  $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , pak

$$\mathbf{e} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}) \setminus \{\mathbf{0}\} \Leftrightarrow \mathbf{A} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{0} = 0 \mathbf{e}, \mathbf{e} \neq \mathbf{0}.$$



## Vlastní čísla a vektory

### Příklad: Vlastní čísla a vektory ortogonálního projektoru.

Bud'  $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ortogonální projektor na  $\mathcal{H}(\mathbf{A})$ , kde  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ . Pak

$$\forall \mathbf{e} \in \mathcal{H}(\mathbf{A}) : \mathbf{P} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{e},$$

a tedy  $\lambda := 1$  je vlastní číslo, k němuž náleží lib. vl. vektor  $\mathbf{e} \in \mathcal{H}(\mathbf{A}) \setminus \{\mathbf{0}\}$ .

Víme, že  $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T) \perp \mathcal{H}(\mathbf{A})$  a

$$\forall \mathbf{n} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^T) : \mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{0} = 0 \mathbf{n},$$

a tedy  $\lambda := 0$  je vlastní číslo příslušející vl. vektorům  $\mathbf{n} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^T) \setminus \{\mathbf{0}\}$ .

### Příklad: Vlastní čísla a vektory permutační matice.

Uvažujme  $\mathbf{P} := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Řešením rovnice  $\begin{pmatrix} e_2 \\ e_1 \end{pmatrix} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e} = \lambda \mathbf{e} = \lambda \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$  je vlastní číslo  $\lambda_1 := 1$  s  $\mathbf{e}_1 := t(1, 1)$ ,  $t \neq 0$ , a vlastní číslo  $\lambda_2 := -1$  s  $\mathbf{e}_2 := s(-1, 1)$ ,  $s \neq 0$ .

## Vlastní čísla a vektory

Příklad: Rozhodněte, které z  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$  jsou vlastní vektory matice  $\mathbf{A}$ ,

$$\text{kde } \mathbf{A} := \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{u} := \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v} := \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{u} = \lambda \mathbf{u} : \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ nemá řešení, } \mathbf{u} \text{ není vl. vektor } \mathbf{A},$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} : \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ má řešení } \lambda = 2, \mathbf{v} \text{ je vl. vektor } \mathbf{A}.$$

# Vlastní čísla a vektory

## Výpočet vlastních čísel

Bud'  $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , hledáme  $\lambda \in \mathbb{C}$  tak, že

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{e} = \lambda \mathbf{e}, \quad \mathbf{e} \neq \mathbf{0}.$$

Po převedení na levou stranu dostáváme

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \cdot \mathbf{e} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{e} \neq \mathbf{0}.$$

Tato rovnice má netriviální řešení, právě když  $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$  je singulární. Vlastní čísla jsou tedy řešením následující **charakteristické** (polynomiální) **rovnice**:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0.$$

## Výpočet vlastních vektorů

Máme-li vlastní číslo  $\lambda \in \mathbb{C}$  matice  $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , pak  $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$  je singulární a odpovídající vlastní vektory jsou z  $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \setminus \{\mathbf{0}\}$ , tedy řešíme homogenní soustavu lin. rovnic

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \cdot \mathbf{e} = \mathbf{0}.$$

## Vlastní čísla a vektory

**Příklad:** Vypočtete vlastní čísla a vektory matice  $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ .

Vyjádřeme determinant  $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}|$

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \left| \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8$$

a řešme charakteristickou rovnicí

$$\underbrace{\lambda^2 - 6\lambda + 8}_{=(\lambda-4)(\lambda-2)} = 0.$$

Řešením jsou vlastní čísla  $\lambda_1 := 4$  a  $\lambda_2 := 2$ . Příslušné vlastní vektory jsou nenulová řešení následujících homogenních soustav lin. rovnic se singulárními maticemi  $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ :

$$(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}) \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{0} : \begin{pmatrix} 3 - 4 & 1 \\ 1 & 3 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{e}_1 := t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \neq 0,$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I}) \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{0} : \begin{pmatrix} 3 - 2 & 1 \\ 1 & 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{e}_2 := s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, s \neq 0.$$

# Vlastní čísla a vektory

## Pozorování

Všimněme si, že výsledek předchozího příkladu

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 4, \mathbf{e}_1 := t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \neq 0; \quad \lambda_2 = 2, \mathbf{e}_2 := s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, s \neq 0$$

je velmi podobný výsledku příkladu s permutační maticí

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 1, \mathbf{e}_1 := t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \neq 0; \quad \lambda_2 = -1, \mathbf{e}_2 := s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, s \neq 0.$$

Není to náhoda.

## Posuv spektra

Spektrum matice  $\mathbf{A} + \alpha \mathbf{I}$  vznikne přičtením  $\alpha \in \mathbb{C}$  ke spektru matice  $\mathbf{A}$ , přičemž vlastní vektory  $\mathbf{e}$  zůstávají nezměněny, viz

$$(\mathbf{A} + \alpha \mathbf{I}) \cdot \mathbf{e} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{e} + \alpha \mathbf{e} = \lambda \mathbf{e} + \alpha \mathbf{e} = (\lambda + \alpha) \mathbf{e},$$

kde  $\lambda \in \mathbb{C}$  je vlastní číslo  $\mathbf{A}$ .

## Vlastní čísla a vektory

**Příklad:** Vypočtete vlastní čísla a vektory matice  $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ .

Vyjádřeme determinant  $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}|$

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \left| \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

a řešme charakteristickou rovnici

$$\lambda^2 + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_1 := i, \quad \lambda_2 := -i.$$

Příslušné vlastní vektory jsou nenulová řešení následujících homogenních soustav lin. rovnic se singulárními maticemi  $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ :

$$(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}) \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{0} : \quad \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{e}_1 := t \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad t \neq 0,$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I}) \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{0} : \quad \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{e}_2 := s \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad s \neq 0.$$

Všimněme si, že vlastní čísla i vektory jsou komplexně sdružené.

# Vlastní čísla a vektory

## Reálné matice mají komplexně sdružená vlastní čísla i vektory

Nechť  $\lambda \in \mathbb{C}$  a  $\mathbf{e} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$  jsou si odpovídající vlastní číslo a vektor  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , tj.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{e} = \lambda \mathbf{e}, \quad \mathbf{e} \neq \mathbf{0}.$$

Aplikujme na rovnici komplexní sdružení (změna znaménka imaginárních částí)

$$\left. \begin{array}{l} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{e})_i^* = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{e}^*)_i \\ (\lambda \mathbf{e})_i^* = (\lambda^* \mathbf{e}^*)_i \end{array} \right\} \Rightarrow \mathbf{A} \cdot \mathbf{e}^* = \lambda^* \mathbf{e}^*,$$

a tedy  $\lambda^*$  a  $\mathbf{e}^*$  jsou také odpovídající si vlastní číslo a vektor  $\mathbf{A}$ .

# Vlastní čísla a vektory

## Součet a součin vlastních čísel

Mějme  $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ . Levou stranu charakteristické rovnice, tzv. **charakteristický polynom** můžeme (podle základní věty algebry) přepsat na součin kořenových činitelů

$$p_n(\lambda) := |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = (\lambda_1 - \lambda) \cdot (\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda),$$

v níž vystupují všechna vlastní čísla  $\lambda_i \in \mathbb{C}$  matice  $\mathbf{A}$ . Dosadíme-li  $\lambda := 0$ , máme

$$\det(\mathbf{A}) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

Odtud vidíme, že **singulární matice má nulové vlastní číslo**. Porovnáním koeficientů u členu  $\lambda$

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= (-\lambda)^n + \cdots - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) \lambda + \det(\mathbf{A}) = \\ &= (\lambda_1 - \lambda) \cdot (\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda) = (-\lambda)^n + \cdots - (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n) \lambda + \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n \end{aligned}$$

dostáváme vztah pro **stopu matice**

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}) := \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_{ii}.$$



## Vlastní čísla a vektory

Příklad: Vypočtete součin a součet vlastních čísel  $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ .

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |\mathbf{A}| = 3 + 4 + 4 - 1 - 4 - 12 = -6,$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr}(\mathbf{A}) = 1 + 1 + 3 = 5.$$

# Vlastní čísla a vektory

## Lokalizace vlastních čísel

Mějme matici  $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$  a libovolnou pár vl. čísla a vektoru  $\lambda$ ,  $\mathbf{e}$ . Necht' pro index  $i \in \{1, \dots, n\}$  je  $|e_i|$  největší složka, tj.  $|e_i| \geq |e_j|$ . Podívejme se na  $i$ -tý řádek rovnice:

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{e})_i = a_{i1}e_1 + \dots + a_{i,i-1}e_{i-1} + a_{ii}e_i + a_{i,i+1}e_{i+1} + \dots + a_{in}e_n = \lambda e_i.$$

Převeďme diagonální člen k členu s  $\lambda$  a odhadněme absolutní hodnotu

$$|\lambda - a_{ii}| |e_i| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij} e_j \right| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |e_j| \leq |e_i| \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Tím jsme dokázali následující Geršgorinovu větu:

$$\sigma(\mathbf{A}) \subset \bigcup_{i=1}^n K_i, \quad \text{kde } K_i := \left\{ \sigma \in \mathbb{C} : |\sigma - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}.$$

Spektrum matice se nachází v  $n$  kruzích  $K_i$  komplexní roviny.

## Vlastní čísla a vektory


Příklad: Lokalizujte vlastní čísla matice  $A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ .

Kruh  $K_1$ : střed v  $a_{11} = 2$ , poloměr  $|a_{12}| + |a_{13}| + |a_{14}| = |1| + |0| + |-1| = 2$ ,

kruh  $K_2$ : střed v  $a_{22} = 4$ , poloměr  $|a_{21}| + |a_{23}| + |a_{24}| = |1| + |1| + |-1| = 3$ ,

kruh  $K_3$ : střed v  $a_{33} = 2$ , poloměr  $|a_{31}| + |a_{32}| + |a_{34}| = |0| + |1| + |0| = 1$ ,

kruh  $K_4$ : střed v  $a_{44} = 3$ , poloměr  $|a_{41}| + |a_{42}| + |a_{43}| = |0| + |-1| + |0| = 1$ .



# Vlastní čísla a vektory diagonalizují matici lineárního zobrazení

## Diagonalizace

Mějme  $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , označme vlastní čísla  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$  a předpokládejme, že příslušné vlastní vektory  $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$  jsou lin. nezávislé. Pak

$$\mathbf{A} \cdot \underbrace{(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)}_{=: \mathbf{U}} = (\lambda_1 \mathbf{e}_1, \dots, \lambda_n \mathbf{e}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{D}},$$

a tedy

$$\mathbf{U}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{D}.$$

Na levé straně rovnosti je podobnostní transformace matice  $\mathbf{A}$ , tj. vyjádření lineárního zobrazení  $A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$  v bázi vlastních vektorů. Máme novou faktorizaci

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{U}^{-1}.$$

# Vlastní čísla a vektory diagonalizují matici lineárního zobrazení

## Diagonalizace reálných symetrických matic

Reálná symetrická matice  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  má reálná vlastní čísla, viz

$$\lambda \|\mathbf{e}\|^2 = (\mathbf{e}^*)^T \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{e}) = \mathbf{e}^T \cdot \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{e}^* = \mathbf{e}^T \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{e})^* = \lambda^* \|\mathbf{e}\|^2,$$

a tedy  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Vlastní vektory příslušející různým vlastním číslům jsou ortogonální, viz

$$\lambda_i \mathbf{e}_j^T \cdot \mathbf{e}_i = \mathbf{e}_j^T \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{e}_i) = \mathbf{e}_i^T \cdot \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i^T \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{e}_j) = \lambda_j \mathbf{e}_i^T \cdot \mathbf{e}_j,$$

a jelikož  $\lambda_i \neq \lambda_j$ , platí, že  $\mathbf{e}_i^T \cdot \mathbf{e}_j = 0$ .

## Důsledek: Spektrální rozklad

Reálnou symetrickou matici  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  lze rozložit na součin

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{U}^T,$$

kde  $\mathbf{D} := \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  je diagonální matice obsahující vlastní čísla  $\mathbf{A}$  a  $\mathbf{U} := (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$  obsahuje ortonormální bázi vlastních vektorů.

# Vlastní čísla a vektory diagonalizují matici lineárního zobrazení

**Příklad:** Vypočtete spektrální rozklad matice  $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Spočtíme vlastní čísla

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \begin{array}{l} \lambda_1 := 3, \\ \lambda_2 := -1. \end{array}$$

Těm odpovídají vlastní vektory

$$(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}) \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{0} : \begin{pmatrix} 1 - 3 & 2 \\ 2 & 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{e}_1 := t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \neq 0,$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I}) \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{0} : \begin{pmatrix} 1 - (-1) & 2 \\ 2 & 1 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{e}_2 := s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, s \neq 0.$$

Zvolíme  $t := s := 1/\sqrt{2}$  a dostáváme spektrální rozklad

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{=\mathbf{A}} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{U}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{D}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_{=:\mathbf{U}^T}.$$

# Vlastní čísla a vektory diagonalizují matici lineárního zobrazení

Reálné symetrické matice zobrazují jednotkovou kouli na elipsoidy.

Následující obrázek ilustruje spektrální rozklad  $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  z předchozího příkladu.

